

# GASTROTOX® E

Esca granulare a base di Metaldeide per la lotta contro  
chioccioline e limacce.

## GASTROTOX E - Composizione:

- Metaldeide pura ..... g. 5
- Coadiuvanti\*, coloranti, inerti: quanto basta a . . . . g. 100

\*contiene denatonio benzoato, sostanza amaricante atta a ridurre il rischio di ingestione accidentale da parte di bambini e di animali non bersaglio

## INDICAZIONI DI PERICOLO

Sospettato di nuocere alla fertilità (H361f). Per evitare rischi per la salute umana e l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso (EUH401).

## CONSIGLI DI PRUDENZA

Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso (P201). Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze (P202). Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso (P280). IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico (P308+P313). Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale/regionale/nazionale/internazionale (P501).



**ATTENZIONE**

## TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE

SIPCAM OXON S.p.A.

Sede legale: via Carroccio 8 - Milano

Tel. 0371/5961

Registrazione n. 2260 del 5.7.76 del Ministero della Sanità

## Officina di produzione:

SIPCAM OXON S.p.A. - Salerano sul Lambro (Lodi)

SIPCAM Inagra - Sueca (Spagna)

Taglie: g. 200 kg. 1 - 5 - 10

Partita n.: .....

® Marchio registrato

## PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Le esche devono essere disposte in modo da minimizzare il rischio di ingestione da parte di altri animali.

## INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento grave per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle.

### Sintomi di intossicazione:

Violenti dolori addominali - diarrea - vomito biancastro (aspetto di latte cagliato) - shock - midriasi - ipotermia - convulsioni - obnubilazione del sensorio.

Consigli medici di massima e condizionati al caso.

Lavanda gastrica con bicarbonato di sodio (gr. 5 per litro di acqua) - riscaldare il paziente - cardiotonici - fleboclisi clorurate o glucosate con noradrenalina - diuretici - barbiturici - neuroplegici - anfetamina e derivati in caso di torpore.

**AVVERTENZA:** consultare un Centro Antiveleni

## CARATTERISTICHE

Il prodotto consente di ottenere risultati efficaci ed in brevissimo tempo. Per le sue peculiari caratteristiche il prodotto può essere vantaggiosamente impiegato in ogni caso in cui si debbano eliminare infestazioni di chioccioline e limacce, nelle coltivazioni di pieno campo, nelle colture ortive, nei giardini, nelle serre.

## MODALITÀ DI IMPIEGO

Il prodotto deve essere dapprima distribuito in quantità piuttosto abbondante su una striscia larga all'incirca m. 0,5 - 1 lungo tutti i bordi dell'appezzamento da disinfestare; indi si distribuisce alle dosi riportate in tabella su tutta la superficie da trattare. Il trattamento va ripetuto dopo 10-14 giorni.

Negli orti, il prodotto si usa distribuendo 10 granelli per ogni mq., oppure spargendo a mucchietti opportunamente distanziati.

## CAMPI E DOSI D'IMPIEGO

Il prodotto si può impiegare alle dosi (riferite ad ettaro di superficie) e con le modalità precedentemente definite sulle seguenti colture:

COLTURA	N. appl.	DOSE kg/ha	Giorni * pre-raccolta
LATTUGHE E SIMILI (Lattughe, Crescione, Dolcetta, Scarola/Indivia, Cicorie (esclusa Witloof), Radicchi, Barbarea, Rucola, Senape nera, foglie e germogli di <i>Brassica spp.</i> etc)	2-3	6-7	20
CAVOLFIORI	2-3	4,2	7
CARCIOFI solo pieno campo	2-3	4,2	7
CAVOLI CAPPUCCIO (Cavolo cappuccio, Cavolo rosso, Cavolo verza, Cavolo bianco) solo pieno campo	2-3	4,2	7
SPINACI E SIMILI (Spinacio, Bietola da foglia e da costa, Portulaca, etc.)	2-3	6-7	20
ERBE FRESCHE (Cerfoglio, Erba cipollina, Prezzemolo, Basilico, Rosmarino, Menta, Menta piperita, Salvia, Timo, Melissa, Borragine, Maggiorana, Angelica, Issopo, Ortica, Origano, Ruta, Santoreggia, Cerfoglio muschiato, Acetosa, Dragoncello, etc.)	2-3	6-7	20
FLOREALI ED ORNAMENTALI	2-3	6-7	--

Per le colture sotto riportate, il prodotto si usa esclusivamente per uso perimetrale (distribuire lungo tutti i bordi del campo per trattare una fascia di m 0,5 - 1, quindi non trattando direttamente le colture).

COLTURA	N. appl.	DOSE kg/ha	Giorni * pre-raccolta
ORTAGGI A STELO (Asparago, Cardo, Sedano, Finocchio, Porro, Rabarbaro, Germogli di bambù, Cuori di Palma)	2-3	4,2	7

(\*) Sospendere i trattamenti seguendo i giorni di carenza riportati in tabella

## **COMPATIBILITÀ**

**Il prodotto si usa da solo.**

### **ATTENZIONE**

**Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Non applicare con i mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato.**