

KOCIDE® OPTI

Fungicida a base di idrossido di rame in granuli idrodispersibili

KOCIDE OPTI - Composizione

100 g di prodotto contengono:

Rame metallo g. 30

(sotto forma di idrossido)

Coformulanti q.b.a g. 100

INDICAZIONI DI PERICOLO: Nocivo se ingerito (H302). Provoca grave irritazione oculare (H319). Nocivo se inalato (H332). Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata (H410). Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso (EUH401).

CONSIGLI DI PRUDENZA: Evitare di respirare la polvere (P261). Lavare accuratamente le mani e il viso dopo l'uso (P264). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso (P270). Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato (P271). Indossare guanti/indumenti protettivi/

Proteggere gli occhi/il viso (P280). **IN CASO DI**

INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un **CENTRO ANTIVELENI** o un medico (P301+P312). **IN CASO DI INALAZIONE:** trasportare l'fortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione (P304+P340). **IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:** sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare (P305+P351+P338). Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico (P337+P313). In caso di malessere, contattare un **CENTRO ANTIVELENI** o un medico (P312). Sciacquare la bocca (P330). Raccogliere il materiale fuoriuscito (P391). Smaltire il prodotto/recipiente in conformità della normativa vigente (P501).

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: (EUH401) Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

Titolare della Registrazione

Cosaco GmbH

Singapurstrasse, 1 - 20457 Amburgo (Germania)

Tel. +49 40236520

Stabilimenti di produzione (formulazione e confezionamento o sola formulazione):

Cosaco LLC – 12701 Alameda Road – Houston, TX 77045 (USA)

Cosaco GmbH - Hovestrassen 50 - D 20539 Amburgo (Germania)

Stabilimenti di confezionamento:

Du Pont de Nemours (France) S.A.S. – Cernay (Francia)

Scam S.p.A. – Strada Bellaria 164, S. Maria di Mugnano (MO)

STI Solfotecnica Italiana SpA - Via Torricelli, 2 - Cotignola (RA)

Distribuito da: Certis Belchim B.V.

Via Varese 25D, scala A – 21047 Saronno (VA) Tel. 029609983

Registrazione n. 14686 del 09.12.2010 del Ministero della Salute

Contenuto netto: kg 0,5-1-1,5-2-3-5-6-10-15-20-25 Partita n°.....



ATTENZIONE

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Durante il caricamento e la miscelazione del prodotto usare occhiali protettivi e visiera. Non rientrare nelle zone trattate prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata da corpi idrici superficiali di:

- 10 metri su VITE

- 10 metri utilizzando ugelli con riduzione della deriva del 50% oppure 20 m su OLIVO

- 5 metri utilizzando ugelli con riduzione della deriva del 50% o 10 metri su POMODORO e MELANZANA.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e dei SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. **Terapia:** gastrolusi con soluzione latte-albuminosa, se cupezia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

CARATTERISTICHE

KOCIDE OPTI è un fungicida a base di rame idrossido in granuli idrodispersibili. Tale formulazione garantisce un'ottima fluidità del prodotto, nonché elevata adesività e persistenza sulle colture trattate.

EPOCHE, DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Introdurre i granuli nel serbatoio dell'irroratrice, parzialmente riempita d'acqua e mescolare sino a completa dissoluzione del preparato. Le dosi indicate si riferiscono a 100 litri d'acqua, salvo diverse indicazioni. Effettuare i trattamenti con pompe a volume normale.

Vite da vino: applicazioni ogni 7 giorni con volumi d'acqua di 400-1200 l/ha

Peronospora e Marciume nero degli acinig 100-150

Effettuare al massimo 6 applicazioni per ciclo colturale.

Vite da tavola: applicazioni ogni 7 giorni con volumi d'acqua di 400-1000 l/ha

Peronospora e Marciume nero degli acinig 100-150

Effettuare al massimo 6 applicazioni per ciclo colturale.

Pomodoro da mensa e melanzana in pieno campo: applicazioni ogni 7 giorni con volumi d'acqua di 500-1500 l/ha

Peronospora, Alternaria, Septoria, Batteriosi*g 100-150

Effettuare al massimo 6 applicazioni per ciclo colturale.

Pomodoro da industria: applicazioni ogni 7 giorni con volumi d'acqua di 500-1000 l/ha

Peronospora, Alternaria, Septoria, Batteriosi*g 100-150

Effettuare al massimo 6 applicazioni per ciclo colturale.

*Batteriosi: attività collaterale

Olivo: applicazioni ogni 7 giorni con volumi d'acqua di 1000-1500 l/ha

Occhio di Pavoneg 150

Effettuare al massimo 3 applicazioni per ciclo colturale.

Per tutte le colture non superare la dose complessiva di 13 kg/ha di prodotto per anno.

Al fine di ridurre al minimo il potenziale accumulo nel suolo e l'esposizione per gli organismi non bersaglio, tenendo conto al contempo delle condizioni agroclimatiche, non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di rame per ettaro nell'arco di 7 anni. Si raccomanda di rispettare il quantitativo applicato medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno.

COMPATIBILITÀ

KOCIDE OPTI non è miscibile con prodotti fitosanitari a reazione alcalina e con Tiram. **AVVERTENZA:** In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

INTERVALLO DI SICUREZZA

Sospendere i trattamenti 3 giorni prima della raccolta di pomodoro da mensa e melanzana; 10 giorni prima della raccolta i pomodoro da industria; 20 giorni prima della raccolta di vite e olivo.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle di tutte le indicazioni contenute in questa etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

® Marchio registrato Cosaco LLC