

**RIVAL****Concentrato Solubile (SL)****FUNGICIDA SISTEMICO PER LA PROTEZIONE DEL POMODORO E DELLE COLTURE FLOREALI E ORNAMENTALI****Meccanismo d'azione: Gruppo F 28 (FRAC)**

Registrazione del Ministero della Salute n° 16477 del 17/7/2018

Composizione:

**PROPAMOCARB CLORIDRATO puro** g. 67 (=722 g/L)  
**Coformulanti q.b. a** g. 100

Contenuto: 100-250-500 mL; 1 L

Partita n.....

**Agria S.A.****Asenovgradsko Shose, Plovdiv 4009 (Bulgaria)****Tel +359 32273500**

stabilimenti di produzione:

**Agria S.A.** - Asenovgradsko Shose, Plovdiv 4009 (Bulgaria)**Jiangsu Lanfeng Biochemical Company, Ltd.** - Suhua Road, Xinyi Economic & Technological Development Zone, Jiangsu, Cina**CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.****INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. EUH208 Contiene propamocarb cloridrato e benzosothiazolinone. Possono provocare una reazione allergica. EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.****PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Indossare indumenti protettivi adatti, guanti e stivali in gomma durante la manipolazione del prodotto, delle piante trattate o del terreno/substrato trattato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.****INFORMAZIONI PER IL MEDICO****Il Propamocarb è un carbammato che non presenta una evidente inibizione della colinesterasi.****Consigli terapeutici: Nel caso di intossicazione è sufficiente dare al paziente una sospensione acquosa di carbone attivato; praticare eventualmente una lavanda gastrica. Nei casi di maggiore gravità somministrare atropina soltanto per iniezione, facendo attenzione a non eccedere con le dosi, specialmente nei bambini. Sono inoltre possibili altri trattamenti di supporto da stabilire in base ai sintomi.****Avvertenza: Consultare un Centro Antiveneni.****CARATTERISTICHE**

RIVAL è un fungicida sistemico con azione protettiva contro le malattie del terreno come *Phytophthora* spp. e *Pythium* spp., che attaccano le colture alle radici ed al colletto. Il prodotto è assorbito prevalentemente dalle radici e poi traslocato nell'apparato fogliare, assicurando in tal modo una completa protezione delle piante. Il prodotto si impiega nella disinfezione dei terricciati e dei letti di semina e nei trattamenti al terreno in pre e post-trapianto delle colture di pomodoro e piante floreali e ornamentali coltivate in serra. Il prodotto inibisce la biosintesi degli acidi grassi e dei fosfolipidi riducendo in questo modo la crescita del micelio e lo sviluppo delle zoospore e degli sporangi.

**DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO****Disinfezione dei terricciati e del terreno destinato alla coltivazione di pomodori e floreali e ornamentali in serra:** contro *Phytophthora* spp. e *Pythium* spp., 300 ml di prodotto per metro cubo di terreno/terricciato, distribuiti con 10-20 L di acqua.**Pomodoro (in serra):** contro *Phytophthora* spp. e *Pythium* spp., intervenire alla semina/trapianto alla dose di 10ml di prodotto per m<sup>2</sup>, distribuiti con 3-5 L di acqua per m<sup>2</sup>. Ripetere i trattamenti, fino ad un massimo di tre per anno, ad intervalli di 7-10 giorni.**Floreali e ornamentali (in serra):** contro *Phytophthora* spp. e *Pythium* spp., intervenire alla semina/trapianto alla dose di 10 ml di prodotto per m<sup>2</sup>, distribuiti con 3 L di acqua per m<sup>2</sup>. Ripetere i trattamenti, fino ad un massimo di due per anno, ad intervalli di 14-21 giorni.**GESTIONE DELLE RESISTENZE**

Per evitare l'insorgere di fenomeni di resistenza attenersi alle indicazioni riportate in etichetta e alternare RIVAL a prodotti aventi differente meccanismo d'azione.

**COMPATIBILITÀ****Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.**PREPARAZIONE DELLA MISCELA**

Riempire il serbatoio dell'attrezzatura di distribuzione a metà con acqua, aggiungere la quantità prevista di prodotto e miscelare, quindi aggiungere altra acqua fino al volume desiderato agitando accuratamente. Dopo l'applicazione sciacquare a fondo con acqua per almeno tre volte l'attrezzatura utilizzata.

**ATTENZIONE****Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.****NON APPLICARE CON MEZZI AEREI****OPERARE IN ASSENZA DI VENTO****DA NON VENDERSI SFUSO****SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI****IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE****IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO**

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

## RIVAL

**Concentrato Solubile (SL)**  
**FUNGICIDA SISTEMICO PER LA PROTEZIONE DEL POMODORO E DELLE**  
**COLTURE FLOREALI E ORNAMENTALI**

**Meccanismo d'azione: Gruppo F 28 (FRAC)**

Registrazione del Ministero della Salute n° 16477 del 17/7/2018

Composizione:

**PROPAMOCARB CLORIDRATO puro** g. 67 (=722 g/L)

Contenuto: 100 mL

**Coformulanti q.b. a**

g. 100

Partita n.....

### Agria S.A.

**Asenovgradsko Shose, Plovdiv 4009 (Bulgaria)**

**Tel +359 32273500**

stabilimenti di produzione:

**Agria S.A. - Asenovgradsko Shose, Plovdiv 4009 (Bulgaria)**

**Jiangsu Lanfeng Biochemical Company, Ltd.**

Suhua Road, Xinyi Economic & Technological Development Zone, Jiangsu, Cina

**CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/ Proteggere gli occhi/il viso.**

**INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. EUH208 Contiene propamocarb cloridrato e benzisothiazolinone. Possono provocare una reazione allergica. EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.**

**PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO**  
**SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI**  
**IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO**  
**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE**  
**DISPERSO NELL'AMBIENTE**