

ROMULAN

Regolatore di crescita per pomacee (melo e pero), drupacee (pesco, nettarino, susino e ciliegio), vite, cachi e mandorlo (SOSPENSIONE CONCENTRATA)

ROMULAN - Registrazione del Ministero della Salute n. 16485 del 24/11/2015

Composizione:

Paclobutrazol puro	g.	23,6 (250 g/L)
Coformulanti	q.b. a	g. 100

PROPLAN Plant Protection Co. S.L.

C. Valle del Roncal, 12 – 1ª Oficina nº7
E-28232 Las Rozas, Madrid (Spagna)
Tel. +34 91.626.60.97

Stabilimenti di produzione:

Laboratorios Sirga S.A. - P.I. Del Mediterraneo
46560 Massafassar (Valencia) Spagna
Ciech Sarzyna SA
Ul. Chemikow 1- 37-310 Nowa Sarzyna (Polonia)

Distribuito da:

CHEMIA S.p.A.
S.S. Statale 255, Km. 46
44047 S.Agostino (FE) - Tel. 0532-848477
ITACA S.r.l.

Via Monte Grappa, 7 – 24121 Bergamo - Tel. 0331 440977

DEMETRA Italia S.r.l.

Via San Vitale, 5

40060 Sesto Imolese – Imola (BO) - Tel. 0542.670170

CHEMINOVA AGRO ITALIA S.r.l.

Via Fratelli Bronzetti, 32/28 – 24124 Bergamo

Tel 035 19904468

AGROWIN BIOSCIENCES S.r.l.

Via Monte Grappa, 7 – 24121 Bergamo - Tel. 0331 440977

INDICAZIONI DI PERICOLO: H361d Sospettato di nuocere al feto, H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

CONSIGLI DI PRUDENZA:

PREVENZIONE: P201 Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso, P202 Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze, P273 Non disperdere nell'ambiente.

REAZIONE: P308+P313 IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico, P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.

CONSERVAZIONE: P405 Conservare sotto chiave.

SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Negli impieghi su pomacee, drupacee, vite, per proteggere gli organismi acquatici, rispettare una fascia di sicurezza vegetata non trattata di 10 m da corpi idrici superficiali; Negli impieghi su mandorlo, cachi e ciliegio, per proteggere gli organismi acquatici, rispettare una fascia di sicurezza vegetata non trattata di 20 m da corpi idrici superficiali. Non applicare su suoli drenati



ATTENZIONE

Contenuto netto:
250-500mL
1-5-10L
Partita n°

artificialmente. Nell'impiego su mandorlo, per proteggere le api e gli altri insetti impollinatori non applicare durante la fioritura e non applicare in presenza di piante infestanti in fiore. Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

AVVERTENZA: consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE

ROMULAN è un regolatore di crescita ad azione sistemica che agisce riducendo la sintesi delle gibberelline. L'assorbimento del prodotto da parte delle piante avviene attraverso le radici nelle applicazioni al suolo e attraverso le foglie e i germogli nelle applicazioni fogliari.

L'effetto principale è la riduzione della crescita vegetativa. La vigoria viene controllata riducendo la lunghezza degli internodi dei nuovi germogli e la formazione precoce di germogli laterali. Può anche influenzare favorevolmente la formazione di gemme a fiore, nella qualità dei frutti e nella resa delle raccolte.

Favorisce la formazione di alberi più piccoli e facili da gestire, riducendo il numero e l'intensità delle loro potature.

Gli alberi trattati con ROMULAN devono essere sani e vigorosi.

USI AUTORIZZATI, DOSI ED EPOCHE D'IMPIEGO

POMACEE (melo e pero): per ridurre la lunghezza dei germogli. Può anche influenzare favorevolmente la formazione di gemme a fiore, la qualità dei frutti e la resa del raccolto.

Si applica per via fogliare alla dose di 200 ml/ha di ROMULAN con volumi d'acqua di 500-1000 L/ha. Effettuare un massimo di 4 trattamenti con un intervallo di 7 giorni. Eseguire la prima applicazione durante lo sviluppo del frutto, dalla allegazione in poi (BBCH 73).

Lasciare un intervallo di sicurezza tra l'ultimo trattamento e la raccolta di almeno 60 giorni.

DRUPACEE (pesco, nettarino, susino e ciliegio): Per ridurre la lunghezza dei germogli. Può anche influenzare favorevolmente la formazione di gemme a fiore, la qualità dei frutti e la resa del raccolto.

Applicare in impianti dotati di sistemi di irrigazione a goccia alla dose di 0,8 L/ha di ROMULAN. Sciogliere la dose prevista da applicare per ogni albero in 250-500 ml d'acqua e distribuire la soluzione proporzionalmente al numero di gocciolatoi di ogni albero. Si consiglia irrigare prima per formare un piccolo ristagno sotto i gocciolatoi. Eseguire i trattamenti a partire dallo stadio di gemme invernali (BBCH 10) fino allo stadio di bottoni rosa (BBCH 57).

VITE: Per ridurre la lunghezza dei germogli e per evitare la caduta dei fiori in varietà con problemi di allegazione. Può influenzare favorevolmente la resa del raccolto.

Applicare per via fogliare in pre-fioritura, circa 2 settimane prima dell'inizio della stessa, alla dose di 0,2-0,25 L/ha, impiegando volumi d'acqua di 150-200 L/ha. L'applicazione del ROMULAN si può far coincidere con i normali trattamenti contro Peronospora e Oidio. Su vite da vino non miscelare con fungicidi della famiglia dei triazoli.

CACHI, MANDORLO: Per ridurre la lunghezza dei germogli. Può anche influenzare favorevolmente la formazione di gemme a fiore, la qualità dei frutti e la resa del raccolto

Applicare in impianti dotati di sistemi di irrigazione a goccia alla dose di 0,8 L/ha di ROMULAN. Sciogliere la dose prevista da applicare per ogni albero in 250-500 ml d'acqua e distribuire la soluzione proporzionalmente al numero di gocciolatoi di ogni albero. Si consiglia irrigare prima per formare un piccolo ristagno sotto i gocciolatoi.

Su cachi, eseguire i trattamenti a partire dallo stadio di gemme invernali (BBCH 10) fino a BBCH 57 (petali appena visibili).

Su mandorlo, applicare prima di BBCH 72 (caduta calice).

AVVERTENZE AGRONOMICHE

- Non impiegare ROMULAN in presenza di vento al fine di evitare la deriva del prodotto a colture limitrofe.
- Piante di grandi dimensioni o molto vigorose possono essere più difficili da mantenere sotto controllo e i risultati possono risultare insoddisfacenti.
- Non usare ROMULAN su alberi che presentano scarsa vigoria, crescita stentata o sotto stress.
- I trattamenti con ROMULAN possono favorire un anticipo della fioritura. Per assicurare l'impollinazione incrociata, devono anche essere trattati gli alberi impollinatori.
- Non impiegare ROMULAN l'anno precedente l'estirpazione della coltura. La coltivazione di cereali l'anno successivo non presenta problemi, mentre per la messa a dimora di altre colture si raccomanda di eseguire una prova su piccola scala.
- Non applicare ROMULAN su piante giovani appena messe a dimora che di solito richiedono uno sviluppo vegetativo vigoroso.
- Non usare ROMULAN su impianti di pomacee, drupacee e vite che prevedono coltivazioni intercalate di piante annuali.
- Se per un qualsiasi motivo si genera un controllo eccessivo della vigoria delle piante, si raccomanda non riapplicare ROMULAN fino a quando le piante non abbiano recuperato il vigore desiderato.

Sciquare accuratamente tre volte il contenitore versando l'acqua di lavaggio nella botte dell'irroratrice.

COMPATIBILITÀ:

Su vite da vino non miscelare con fungicidi della famiglia dei triazoli. Prima di utilizzare ROMULAN in miscela estemporanea con altri prodotti è consigliabile di effettuare una prova di compatibilità/selettività su piccola scala.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

CONSERVAZIONE:

Il prodotto è stabile per 2 anni se conservato nella sua confezione integra

Sospendere il trattamento 60 giorni prima della raccolta delle pomacee.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO
NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 3 novembre 2021