

# FENOXILENE® 200

DISERBANTE SELETTIVO  
PER CEREALI, RISO, MAIS, MELO, PERO, AGRUMI, OLIVO, VITE  
CONCENTRATO SOLUBILE

GRUPPO **O** ERBICIDA

## FENOXILENE 200

### COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:  
MCPA puro g 19,01 (= 200 g/l)  
(da sale dimetilamminico)  
Coformulanti q.b. a 100 g

### INDICAZIONI DI PERICOLO

H302 – Nocivo se ingerito.  
H315 – Provoca irritazione cutanea.  
H318 – Provoca gravi lesioni oculari.  
H411 – Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  
EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

### CONSIGLI DI PRUDENZA

P264 – Lavare accuratamente dopo l'uso. P270 – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.  
P330 – Sciacquare la bocca. P301 + P312 – In caso di ingestione accompagnata da malessere: contattare un centro antiveleni o un medico.  
P280 – Indossare guanti / indumenti protettivi / Proteggere gli occhi / il viso. P305 + P351 + P338 – In caso di contatto con gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P273 – Non disperdere nell'ambiente. P501 – Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alle norme locali / nazionali vigenti.

Nufarm Italia S.r.l. Viale Luigi Majno, 17/A Milano.  
Sede amm.va Via Guelfa, 5 – Bologna Tel. 051 0394022

Distribuito da: SIPCAM Italia S.p.A. - Via Sempione 195 – Pero (MI)

### Stabilimento di produzione:

Nufarm GmbH & Co KG – St. Peter Strasse, 25 – Linz (Austria)  
Nufarm UK Ltd. – Wyke (UK)  
Nufarm S.A.S. - Notre Dame de la Garenne, 27600 Gaillon (Francia)

### Stabilimento di confezionamento:

SIPCAM Oxon S.p.A. – Salerano sul Lambro (LO)

Registrazione Ministero della Sanità n. 3767 del 19/06/1980

Contenuto netto: 250-500 ml 1-5-10-20 litri  
Partita n. Vedere contenitore



PERICOLO

## MODALITÀ D'IMPIEGO

FENOXILENE 200 è un erbicida ormonico per il controllo in post-emergenza delle erbe infestanti dicotiledoni su cereali e fruttiferi. È assorbito prevalentemente dalle foglie, poi viene traslocato fino ai tessuti meristemati dove esplica la sua azione erbicida.

Le infestanti a foglia larga (Dicotiledoni) sia annuali che perenni controllate sono numerose e comprendono *Alisma* spp. (cucchiaino), *Amaranthus retroflexus* (amaranto), *Brassica napus* (colza), *Chenopodium album* (farinaccio), *Cirsium arvense* (cardo campestre), *Convolvulus arvensis* (convulvolo), *Cyperus difformis* (cipero globoso), *Diplotaxis erucoides* (rucola selvatica), *Fumaria officinalis* (fumaria), *Geranium* spp. (geranio), *Polygonum aviculare* (correggiola), *Papaver Rhoeas* (papavero), *Raphanus raphanistrum* (ravanello selvatico), *Taraxacum officinale* (soffione).

Si versa la quantità prestabilita di FENOXILENE 200 direttamente nel totale quantitativo di acqua, mescolando con cura. Si consiglia di effettuare il trattamento con tempo non tendente al piovoso e con temperature dell'aria non inferiori a 12 °C. Utilizzare 200-400 litri di acqua per ettaro con attrezzatura a bassa pressione.

**Numero massimo di trattamenti: 1 per ogni anno.**

**Cereali (Frumento, orzo, segale, triticale, avena): 4 - 5 litri per ettaro**

Effettuare una sola applicazione. Il trattamento si effettua tra l'accestimento e l'inizio della levata. La dose minore è consigliata su infestanti ai primi stadi di sviluppo.

**Riso: 1,5 litri per ettaro**

Il trattamento si effettua non prima dell'emissione della quinta foglia fino allo stadio di botticella. I risultati migliori si ottengono quando le infestanti sono nei primi stadi di sviluppo. Prima del trattamento occorre abbassare il più possibile il livello dell'acqua per fare emergere le infestanti senza arrivare però all'asciutta (almeno 1-2 cm di acqua). Successivamente innalzare il livello dell'acqua non prima che siano trascorse 24 ore dall'intervento.

**Mais: 4 litri per ettaro**

Il trattamento si effettua quando la coltura è allo stadio di 4 foglie.

**Vite: 3,75 - 5 litri per ettaro**

Eseguire l'applicazione solo localizzata in banda lungo i filari e non su piena superficie del vigneto. Adattare la dose all'area effettivamente trattata, fino ad un massimo del 40% della superficie coltivata (non superare quindi un totale di 2 litri di prodotto per ettaro di vigneto). In caso di applicazioni localizzate alle sole aree infestate (a macchia), applicare sempre la dose di 5 litri per ettaro. Evitare in ogni caso che il prodotto giunga a contatto, anche in forma indiretta, con la coltura (esempio polloni e tralci). Non trattare vigneti allevati ad alberello o con altre forme in cui il fogliame o i grappoli siano molto vicini al suolo (non meno di 70 cm). Utilizzare solo ugelli antideriva ed attrezzature schermate.

**Agrumi, Olivo, Melo e Pero: 6 litri per ettaro**

Evitare in ogni caso che il prodotto giunga a contatto, anche in forma indiretta, con la coltura. Per le applicazioni su olivo, evitare di trattare all'epoca della caduta delle olive. In caso di applicazioni localizzate (sotto chioma, sulla fila ecc.) adattare la dose alla superficie effettivamente trattata.

**Avvertenza:** In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

## FITOTOSSICITÀ

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Evitare che la miscela giunga a contatto con colture vicine sensibili, quali fruttiferi, vite, pioppo, piante ortive e in genere tutte le piante non graminacee, anche sotto forma di vapori portati dal vento. Le attrezzature usate per il diserbo devono essere accuratamente e ripetutamente lavate prima di essere utilizzate per altri trattamenti antiparassitari.

## RISCHI DI NOCIVITÀ

Il prodotto è nocivo per animali domestici e bestiame.

## INTERVALLO DI SICUREZZA

sospendere i trattamenti:

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 5/12/2017 e modificata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal 30/06/2024

**30 giorni prima della raccolta per vite;**  
**70 giorni prima della raccolta per mais e cereali;**  
**80 giorni prima della raccolta per melo, pero, agrumi e olivo;**  
**100 giorni prima della raccolta per il riso.**

**ATTENZIONE:** da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Da non applicare con mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; Operare in assenza di vento; Da non venderci sfuso; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato.